

Rekonvaleszenz



Flüssig: 3 x 200 ml

Durchschnittliche Analyse:

	pro 100 ml
Energie (kcal ME) ¹	104
Protein (%)	8,2
Fettgehalt (%)	5,2
NFE (%)	5,1
Omega 3 (%)	0,29
Omega 6 (%)	1,14
EPA + DHA (%)	0,12
Kalzium (%)	0,2
Phosphor (%)	0,17
Natrium (%)	0,1

¹ nach NRC 2006

RECOVERY LIQUID enthält einen patentierten Antioxidanzienkomplex aus Vitamin E und C, Taurin und Lutein. Siehe Langanalysentabellen.


Anwendungsbereiche:

- In der Rekonvaleszenz
- Unterernährung
- Hepatische Lipidose
- Akuter und chronischer Durchfall
- Wieder-Anfütterung nach Anorexie
- Nach Operationen und in der Intensivstation

Nicht geeignet für/bei:

- Pankreatitis
- Wachstum
- Hepatische Enzephalopathie
- Trächtigkeit und Laktation

Produktvorteile:



Hoher Proteingehalt
Der erhöhte Proteingehalt unterstützt den Erhalt der Muskelsubstanz.



Angepasster Energiegehalt
Der tägliche Energiebedarf wird dank der hohen Energiedichte bereits mit einer geringen Futtermenge gedeckt.



Komplettnahrung
Eine vollwertige und ausgeglichene Flüssignahrung zur Unterstützung der Nährstoffzufuhr und Genesung von Hunden und Katzen, die eine enterale Ernährung benötigen.



Antioxidanzien
Eine synergistisch wirkende Antioxidanzienkombination (Vit. E, Vit. C, Taurin, Lutein) kann helfen, die Körperzellen vor Angriffen aggressiver Stoffwechselprodukte zu schützen.



Sondenfütterung
Die besondere Textur ermöglicht den einfachen Einsatz der Nahrung bei Sondenfütterung (auch bei kleindümmigen Sonden) oder peroraler Zufütterung mit der Spritze.

Weitere Informationen:

HUNDE MIT KÄFIGRUHE

Es wird empfohlen, den Energiebedarf in der Ruhezeit (Resting Energy Requirements, RER) einzuhalten, der wie folgt berechnet wird:
RER (in kcal/Tag) = 70 × (Körpergewicht in kg)^{0,75}

Die Futtermenge sollte je nach klinischer Entwicklung des Tieres angepasst werden.

Bei Anorexie wird dringend ein Fütterungsplan empfohlen:

- Bei Anorexie < 3 Tagen: Der Bedarf sollte nach 3 Tagen wieder gedeckt werden.
Tag 1: 1/3 des Bedarfs, Tag 2: 2/3 des Bedarfs, Tag 3: gesamter Bedarf
- Bei Anorexie ≥ 3 Tagen: Der Bedarf sollte nach 5 Tagen wieder gedeckt werden.
Tag 1: 1/4 des Bedarfs, Tag 2: 1/2 des Bedarfs, Tag 3: 2/3 des Bedarfs,
Tag 4: 3/4 des Bedarfs, Tag 5: gesamter Bedarf

Es wird empfohlen, die Tagesration in mehrere kleine Mahlzeiten aufzuteilen.

Zusammensetzung:

Milch und Molkeerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse. Leicht verdauliche Ausgangserzeugnisse: laktosearme Milch, Kaseinat, Sojaproteinkonzentrat, Maltodextrin. Zusatzstoffe² (pro l): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 3660 IE, Vitamin D3: 280 IE, E1 (Eisen): 28,5 mg, E2 (Jod): 0,7 mg, E4 (Kupfer): 2,7 mg, E5 (Mangan): 2,4 mg, E6 (Zink): 42 mg, E8 (Selen): 0,14 mg

² In der Deklaration werden die zusätzlich verwendeten Mengen der Zusatzstoffe angegeben, für die Gesamtmenge die Langanalysen des Produkts betrachten.

Empfohlene Tagesration (ml):

Körpergewicht (kg)	Menge (ml)	Körpergewicht (kg)	Menge (ml)	Körpergewicht (kg)	Menge (ml)
2	115	8	320	18	590
3	155	9	350	20	635
4	190	10	380	25	755
5	225	12	435	30	865
6	260	14	485	35	970
7	290	16	540	40	1 070